



現在、若い世代を中心に感染者が急増している一方、若い世代の3回目ワクチン接種は3～5割台にとどまっています。

現在、若年層を中心に全国的に新規感染者の増加がみられます。
(新規感染者の半数以上が10～30代)



ほぼ全世代において8割以上の方に2回目の接種を完了いただいておりますが、特に、10～30代の若年層における3回目接種率が低いことが課題です。

2回目接種済率
3回目接種済率



若い方であっても、重症化したり、倦怠感などの症状が長引いたりする可能性があります。

3回目のワクチン接種は、皆様ご自身を守るだけでなく、家族、友人、高齢者など、大切な方を守ることにもつながります。ご理解とご協力をよろしくお願いします。

関係団体の皆様へのお願い

若い世代のワクチン接種促進に向けて、7、8月を「ワクチン推進強化月間」とし、政府の広報活動を強化中です。関係団体の皆様からも貴団体における広報等の場において、積極的に働きかけていただけますと幸いです。また、各企業・団体等において従業員にワクチン接種の呼びかけ等が行われますよう、会員企業・団体等の皆様に貴団体から働きかけていただけますと幸いです。参考までに、働きかけに必要なリーフレットや参考動画のURLをご連絡させていただきますので、ご協力何卒よろしくお願い致します。

なお、働きかけるに当たっては、ワクチン接種はご本人の意思に基づき接種いただくものであるため、接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをしたりすることのないようお願い致します

【政府広報動画等】

- 西川きよし氏、蛭原徹氏、J01の皆様との総理対談
- 青山学院大学 原晋監督のテレビCM <https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg24215.html>
- ボンボンTVでの大阪大学忽那教授との対談 <https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg24617.html>
- 総理からのメッセージ動画 <https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg24760.html>
- 3回目接種のお知らせのリーフレット <https://www.mhlw.go.jp/content/000966240.pdf> など

これまでの追加接種等の実績（7/25 公表時点）

4回目接種

総接種回数：7,743,763回（直近公表比+427,048回／日）

うち60歳以上：7,549,505回（直近公表比+413,800回／日）【60歳以上人口に対する接種率 17.5%（直近公表比+2.9%）】
 【3回目接種から5か月経過した60歳以上者に対する接種率 39.3%（直近公表比+2.7%）】

3回目接種

総接種回数：79,261,474回（直近公表比+65,990回／日）【全人口に対する接種率 62.6%（直近公表比+0.2%）】

うち高齢者：32,266,557回（直近公表比+5,365回／日）【高齢者人口に対する接種率 90.2%（直近公表比±0.0%）】

うち職域接種※：4,256,857回（直近公表比+2,051回／週（8日間）） ※7月18日時点

【参考1】先進諸国の人口に対する追加接種率（3・4回目接種回数の計／人口 出典：Our World in Data・7/24更新）

アメリカ 38.1% カナダ 58.8% フランス 61.6% イギリス 59.6% ドイツ 69.4% イタリア 70.8% 日本 68.7%

【参考2】先進諸国の高齢者3回目接種率（出典：各国政府等HPから算定・7/21更新）

アメリカ 64.5% カナダ 82.5% フランス 82.0% イギリス 90.4% ドイツ 85.7% イタリア 87.0%

※対65歳以上人口 ※対60歳以上人口 ※対65歳以上人口 ※対65歳以上人口 ※対60歳以上人口 ※対60歳以上人口

【参考3】1回目、2回目、3回目の人口に対する接種率

全体 1回目接種率 82.0% 2回目接種率 80.9% 3回目接種率 62.6%

高齢者 1回目接種率 93.0% 2回目接種率 92.8% 3回目接種率 90.2%

【参考4】3回目接種年齢階級別接種率（対人口比）

	全体	12～19歳	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60～64歳	65～69歳	70歳代	80歳代	90歳代	100歳以上
3回接種完了者	62.6%	33.2%	47.4%	51.1%	59.9%	77.2%	83.5%	82.6%	90.9%	94.7%	94.7%	91.7%

小児接種（5歳以上～11歳以下）

総接種回数：2,760,812回


うち1回目接種回数：1,432,719回【小児人口に対する接種率 19.3%（直近公表比+0.1%）】

うち2回目接種回数：1,328,093回【小児人口に対する接種率 17.9%（直近公表比+0.1%）】

ワクチンの有効性・安全性等

○ワクチンの有効性

●3回目接種により、感染予防効果、発症予防効果、入院予防効果が回復します



○ワクチンの安全性

新型コロナワクチンの 安全性

- 12～17歳の方に対する安全性については、米国では3回目の接種後7日以内の副反応は、2回目の接種後と同様の症状が、同じ程度かやや高い頻度で現れると報告されています。

□12-17歳の接種後7日間に現れた症状（ファイザー社ワクチンを使用）

報告割合	接種後の症状（2回目→3回目接種後の症状）
50%以上	疼痛（76.0→80.0%）、疲労（58.7→58.5%）、頭痛（56.0→55.9%）
10-50%	筋肉痛（40.9→46.2%）、発熱（38.3→35.5%）、悪寒（27.8→32.6%）、関節痛（16.9→19.7%）、悪心（18.8→18.9%）、腫脹（14.1→18.8%）、発赤（8.4→10.2%）
1-10%	腹痛（9.3→8.5%）、そう痒（7.3→7.4%）、下痢（4.5→3.5%）、嘔吐（2.7→2.3%）、発疹（1.5→1.2%）

出典：MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2022; 71(9): 347-351

- 18歳以上の方に対する安全性については、ファイザー社及び武田/モデルナ社の薬事承認において、3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目の接種後のものと比べると、どちらのワクチンにおいても、一部の症状の出現率に差があるものの、おおむね1・2回目と同様の症状が見られました。



詳しくはこちら


ワクチンを受けた後、数日以内に、胸の痛み、動悸、息切れ、むくみなどの症状がみられた場合は、速やかに医療機関を受診して、ワクチンを受けたことを伝えてください。なお、心筋炎と診断された場合は、一般的には入院が必要となりますが、多くは安静によって自然回復します。

○ワクチンの種類

	1・2回目接種 対象者	3回目接種 対象者	4回目接種 対象者
ファイザー社 ワクチン	12歳以上	12歳以上	60歳以上、 18歳以上の基礎 疾患がある方等
武田/モデルナ社 ワクチン	12歳以上	18歳以上	60歳以上、 18歳以上の基礎 疾患がある方等
武田社ワクチン （ノババックス）	18歳以上	18歳以上	× （使用不可）
アストラゼネカ社 ワクチン	原則40歳以上 （18歳以上も可）	× （使用不可）	× （使用不可）
小児用 ファイザー社 ワクチン	1回目の接種時に 5歳から11歳	× （使用不可）	× （使用不可）

新型コロナウイルスの罹患後症状（いわゆる後遺症）

代表的な罹患後症状の経時的変化



自治体の取組例（愛知県、山梨県、神戸市）

★地元アイドル(SKE48)の直筆サイン入り色紙やマスクが当たるキャンペーン（愛知県）

- 対象期間：2022年6月17日(金)～8月31日(水)
- 対象者：対象期間に3回目接種を受けた12歳～39歳までの愛知県民
- プレゼント内容：SKE48メンバーのサイン入りの色紙又はマスク



※詳しくは、愛知県HP
<https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/wakuchin3-keihatsu.html>

★1万円のプレミアム付き食事券などが当たるキャンペーン（山梨県）

- 対象期間：2022年6月17日(金)～8月4日(木)
- 対象者：7月末までに3回目接種を受けた約12歳～50歳までの山梨県民
- プレゼント内容：プレミアム付き食事券1万円分



※詳しくは、山梨県HP
<https://yamanashi-wakamono-vaccine.jp/>

★イニエスタなどヴィッセル神戸の選手を起用した広告（神戸市）

An advertisement for Vissel Kobe featuring three players: DF 24 長谷部 誠 (Hasebe Makoto), MF 8 アラバ 智也 (Araba Tomoya), and MF 5 久保 健太郎 (Kubo Keitaro). The text at the top reads "VISSEL KOBÉ" and "Kobe will go forward forever. Let's move on up together. Whatever happens, we will overcome. Live the dream." Below the players, the text says "あなたと大切な人のために 3回目のワクチン接種を" (For you and the people you care about, 3rd vaccination). At the bottom, it lists the venue: "神戸市大規模ワクチン接種会場" (Kobe City Large-scale Vaccination Venue), "ノエビアスタジアム神戸 (兵庫区)" (Noevia Stadium Kobe (Higashinada Ward)), and "ハーバーランドセンタービル (中央区) ※3.27(日)まで" (Harborland Center Building (Chuo Ward) ※until 3.27 (Sun)). It also provides contact information for booking: "予約方法" (Booking Method) and "お問い合わせ" (Inquiry), including "インターネット予約" (Internet booking) and "新型コロナウイルス接種コールセンター" (COVID-19 Vaccination Call Center) with the phone number "078-277-3320".



新型コロナウイルス接種についてのお知らせ



新型コロナウイルスをなぜ受けるの？

人の体の中に新型コロナウイルスが入りこみ仲間が増えると、
ねつ、だるさ、せき、息ぐるしさ、頭のいたみ、味覚の変化などがおきて、
体の調子が悪くなります。
ワクチンを受けると、体の中で新型コロナウイルスとたたかう用意ができる
ので、ウイルスが体に入っても、体の調子が悪くなりにくくなります。



新型コロナウイルスを受けるときは、どんなことに注意すればいいの？

受ける前	37.5℃以上のねつがあるときや、体の調子が悪いときは、 ワクチンを受けられないので、そのことをおうちの人に伝えましょう。	
受ける時	ワクチンは肩の近くに注射します。 肩を出しやすい服で、受けに行きましょう。	
受けた後	◎ワクチンを受けた後、15分以上はすわって様子をみましょう。 (30分様子をみる場合もあります) ◎当日はお風呂に入るなど、いつも通りの生活をするのは問題ありませんが、激しい運動はやめましょう。	◎ワクチンを受けると、以下の症状が出ることがありますが、2～3日で自然とよくなるのがわかっています。 ◎ねつ ◎気持ちわるさ ◎だるさ ◎おなかをこわす ◎頭のいたみ ◎さむけ

こんな症状が出たら、おうちの人や周りの大人に知らせましょう。

●受けたすぐ後

- ◎体のかゆさ
- ◎せき



●受けた日や4日くらいの間

- ◎ねつ ◎頭のいたみ ◎胸のいたみ ◎息ぐるしさ
- ◎だるさ ◎さむけ ◎胸がドキドキした感じ



このワクチンは3週間の間をあけて2回受けてください。



守ってほしい、大切なこと。

ワクチンを早く受けている人や、ワクチンを受けられない理由がある人など、様々な人がいます。ワクチンを受けている、受けていないといった理由で周りの人を悪く言ったり、いじめたりすることは、絶対にあってはなりません。



60歳以上の方や、基礎疾患を有する方へ



新型コロナワクチン接種


4回目接種のお知らせ

4

接種費用 無料

全額公費

4回目接種を受けられるようになりました。
4回目接種により、高い重症化予防効果が得られます。



接種の対象

現時点で得られている科学的知見等により、以下の方を対象として、5月下旬を目途に4回目接種を開始いたします。



※重症化リスクが高い具体的な基礎疾患については、厚生労働省「新型コロナワクチンQ&A」をご覧ください。

3回目のワクチン接種から5ヶ月が経過した

① 60歳以上の方 ② 18歳以上で基礎疾患を有する方

その他 重症化リスクが高いと医師が認める方

※①に該当する方は、お住まいの自治体から郵送される接種券を接種会場に持参してください。

※②に該当するか否かについて、

基礎疾患等で医療機関を受診しておられる方や、事前に相談できる医療機関をお持ちの方は、その医療機関の医師にご相談ください。

事前に相談できる医療機関をお持ちでない方は、接種会場の予診の際にご相談ください。
なお、接種券の配布方法は、お住まいの自治体からの情報発信をご確認ください。

①②以外の方々への4回目接種については、
引き続き、様々な情報を収集しながら検討していきます。

使用するワクチン

1～3回目に接種したワクチンの種類に関わらず、
ファイザー社 または 武田/モデルナ社のワクチンを使用します。

新型コロナワクチンの 効果

- 海外の研究では、3回目接種から4か月以上経過した60歳以上の方にファイザー社ワクチンを4回目接種した場合、オミクロン株流行期において、接種後6週間経過しても重症化予防効果が低下せず維持されていたと報告されています。

出典: Bar-On YM et al. Protection by a Fourth Dose of BNT162b2 against Omicron in Israel. NEJM. 2022.

新型コロナワクチンの 安全性

- 海外の研究では、4回目接種後21日目までにおいて、重大な副反応は認めなかったと報告されています。

□ 18歳以上の接種後21日目までに現れた症状

報告割合	ファイザー社 または 武田/モデルナ社
50%以上	疼痛 78.8%
10 - 50%	倦怠感 33.2% 筋肉痛 24.5% 頭痛 21.5% 硬結・腫脹 12.0%
1 - 10%	関節痛 8.4% 37.5度以上の発熱 6.6% リンパ節腫脹 4.7% 紅斑・発赤 8.0% 知覚障害 1.5% アレルギー反応 1.0%

(※) 対象: 274人 (ファイザー社: 154人、武田/モデルナ社: 120人)

出典: Gili Regev-Yochay et al. Efficacy of a Fourth Dose of Covid-19 mRNA Vaccine against Omicron. NEJM. 2022.